


Diagnosen

LA frühkindliche Esotropie mit Kreuzfixation
RA Strabismus sursoadductorius
R/L dissoziiertes Höhenschielen,
Nystagmus latens, Hyperopie, Astigmatismus



Operationen

21.06.2018 R/L Medialis-Rücklagerung 5 + Myopexie 13

Befund

präoperativ

Visus Ferne cc LR-R 17'

Getragene Korrektur:

Obj. Refraktion/Zyklo

Schiellwinkel:

Kopfhaltung:

RA: 0,5

RA: +4,25=-1,0/ 158°

RA: +4,5=-2,0/149°

Ferne: S/A_{RF} +30°-VD4°, LF +30°+VD4°

Nähe: S/A_{RF} +35°-VD5° LF +35°+VD5°

Rebl: +/- VD, Libl: +VD7°, Aufbl.: +27°-VD4°, Abbl.: +27°-VD2°

F bds. offen: RF 10°-15° Rechtsdrehung, 15°-20° Linksneigung

LA: 0,32

LA: +4,0=-1,0/ 33°

LA: +4,25=-1,75/18°

monok. RA: 10° Rechtsdrehung, bis 15° Linksneigung,
monok. LA: 10° Linksdrehung

postoperativ

Visus: Ferne cc LR-R 17,2'

Binokularfunktionen:

Schielwinkel:

Monokulare Exkursion:

Kopfhaltung:

VAA:

Fundus in Mydr.:

RA: 0,25-0,32 st. 0,32-0,4

LA: 0,32 st. 0,4

Bagolini: Ferne altern. Exklusion, Nähe Exklusion RA

Ferne: S/A_{RF} -3°-VD2°, LF +4°+VD8°

Nähe: S/A_{RF} -3°-VD4°, LF -3°+VD5°

Rebl.: +/- VD, Libl.: +VD8°, Aufbl.: -VD4°, Abbl.: -3°-VD7°

RA: Adduktion 20°; LA: Adduktion 25°

F monok. RA: mind. 20° Linksneigung, monok. LA: keine

bds. offen: _{RF} 15° Linksneigung

R/L: postoperativ regelrechter Befund

R/L: postoperativ kein Hinweis auf Perforation

Zusammenfassende Beurteilung

Postoperativ besteht ein kleiner Übereffekt, der vorerst beobachtet werden muss. Doppelbilder bestanden postoperativ am OP-Tag, am Tag nach der OP nicht mehr. Postoperativ wurde einmal erbrochen, was bei retroäquatorialer Myopexie nicht selten ist. Wir bitten Sie, die weiteren postoperativen Kontrollen zu übernehmen und uns in sechs Monaten erneut zu überweisen.